



## 腹膜透析液ペリセート 添付文書改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、添付文書の自主改訂を実施しましたので、下記の通りご案内いたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 該当製品

腹膜透析液

処方箋医薬品 ペリセート 360N 腹膜透析液、ペリセート 400N 腹膜透析液、  
ペリセート 360NL 腹膜透析液、ペリセート 400NL 腹膜透析液

### 改訂箇所

#### 1. ペリセート 360N 腹膜透析液、ペリセート 400N 腹膜透析液

改訂箇所		改訂内容	
【組成・性状】	1. 組成	追加	電解質濃度
	2. 性状	削除	混合液浸透圧
【効能又は効果】		削除	(炭酸カルシウム製剤や活性型ビタミンD製剤の投与により高カルシウム血症をきたす恐れのない場合に用いる。)
【用法及び用量】 ◆用法及び用量に関連する使用上の注意◆		削除	(1)ペリセート 360N 腹膜透析液は患者の体液の過剰が 1kg/日以下の場合、これのみを 1日に 3~4 回交換使用すること。ペリセート 400N 腹膜透析液は患者の体液の過剰が 1kg/日以上の場合、通常 1日に 1~4 回処方し、ペリセート 360N 腹膜透析液と組み合わせて交換使用すること。
【有効成分に関する理化学的知見】		削除	(項目ごと削除。)
【取扱い上の注意】		追加	3. 本品のコネクタを取り扱う際は、リングキャップの外れに注意すること。
【主要文献及び文献請求先】		削除	第二営業部 腹膜透析システム課
【その他】		移動	腹膜透析液のG液とE液の〔混合操作〕最下部欄外に記載

## 2. ペリセート 360 N L 腹膜透析液、ペリセート 400 N L 腹膜透析液

改訂箇所		改訂内容	
【組成・性状】	1. 組成	追加	電解質濃度
	2. 性状	削除	混合液浸透圧
【用法及び用量】 ◆用法及び用量に関連する使用上の注意◆		削除	(1)ペリセート 360NL 腹膜透析液は患者の体液の過剰が 1kg/日以下の場合、これのみを 1 日に 3~4 回交換使用すること。ペリセート 400NL 腹膜透析液は患者の体液の過剰が 1kg/日以上の場合、通常 1 日に 1~4 回処方し、ペリセート 360NL 腹膜透析液と組み合わせて交換使用すること。
【有効成分に関する理化学的知見】		削除	(項目ごと削除。)
【取扱い上の注意】		追加	3. 本品のコネクタを取り扱う際は、リングキャップの外れに注意すること。
【主要文献及び文献請求先】		削除	第二営業部 腹膜透析システム課
[その他]		移動	腹膜透析液の G 液と E 液の〔混合操作〕最下部欄外に記載

### 添付(改訂添付文書)

- ・添付 1 2020 年 1 月改訂 (第 9 版) 処方箋医薬品 ペリセート 360N 腹膜透析液、  
ペリセート 400N 腹膜透析液
- ・添付 2 2020 年 1 月改訂 (第 8 版) 処方箋医薬品 ペリセート 360N L 腹膜透析液、  
ペリセート 400N L 腹膜透析液

### 新添付文書適用日

2020 年 10 月 21 日 (水) 製造分より適用開始

以上

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット 血液浄化営業部

TEL:03-6404-0602